

レジメン登録名

High dose FP療法

<投与薬物>

		投与量
① 5-FU	800 mg/m ² /day	_____ mg
② CDDP	80 mg/m ² /day	_____ mg

5-FU 600mg に減量の場合 _____ mg
 CDDP 60mgに減量の場合 _____ mg

<投与法>

Day 1	[1] 生食100mL+グラニセトロン3mg 1筒+デカドロン1.65mg 6/30min(側管)		
	[2] ハルトマン 1000mL		240min
	[3] フロセミド20mg 1A		iv
	[4] マンニトールS 200mL		15min
	[5] 生食 400ml + CDDP	0 mg	120min
	[6] ハルトマン 500mL		60min
Day 1-5	[7] 生食 500mL + 5-FU	0 mg	20mL/h (1本24時間かけて)

- * CDDP投与前日にも補液1500~2000mL
- * 必要に応じてDay2~5の5-FU前に生食100mL+デカドロン1.65mg 4A
- * ハルトマンとランダは別ルートもしくはランダ施行中はハルトマンを止めて下さい。

<クール>

1週投与、3週休薬 4週1クール

	CDDP投与																				
	↓																				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5-FU投与																				
	22	23	24	25	26	27	28														

<特記事項>

注意)他のフッ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間をあける。