

## レジメン登録名

## FOLFIRI療法

### <投与薬物>

① I-LV	200 mg/m <sup>2</sup> /day
② CPT-11	180 mg/m <sup>2</sup> /day
③ 5-FU	400 mg/m <sup>2</sup> /day
④ 5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup> /day

### 投与量

_____	mg
_____	mg
_____	mg
_____	mg

### <投与法>

[1] グラニセトロン3mg 1筒+デカドロン1.65mg 6A+生食50mL	30min	メイン①	
[2] 生食500mL+ アイソボリン	mg	120min	メイン①
[3] 生食50mL ルートキープ&トポテシンフラッシュ用			メイン②
[4] 5%Glu500mL+ トポテシン	mg	90min	メイン②
[5] 5-FU	mg( )V	ワンショット	メイン②の側管
[6] 5-FU	mg	46hr	メイン②

} 同時投与

[6]はシュアーフューザーに入れて、生食を足し総量100mLくらいで  
 [5]は医師による施行をお願いします。

### <クール> 1週投与、1週休薬 2週間1クール

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	↓														↓ 次クール

### <特記事項>

注意)他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間はあける。