

レジメン登録名

GEM+CDDP療法(時間短縮版)

<投与薬物>

		投与量
① CDDP	25 mg/m ² /day	_____ mg
② GEM	1000 mg/m ² /day	_____ mg
③ イメンド	day1、day8→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day2・day3、day9・day10→イメンド80mg1日1回午前中	

<投与法>

[1] 生食500mL(メイン、ルート確保)	メイン	3hr
[2] 生食100mL+デカドロン1.65mg 4A+グラニセトロン3mg1筒	[1]の側管	30min
[3] 生食500mL + シスプラチン 0 mg	[1]の側管	60min
[4] 生食250mL	[1]の側管	30min
[5] 生食100mL + ジェムザール 0 mg	[1]の側管	30min
[6] 生食250mL	[1]の側管	30min

※) マンニトールや利尿薬を必要に応じて使用。

<クール>

2週投与、1週休薬

3週間1クール

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	↑							↑							↑						
	投与							投与							休薬						
	22																				
	↑																				
	2クール目																				

<特記事項>

【適応患者】

- ・腎機能が十分に維持されていること(CREA値施設基準上限以下かつCLcr60mL/min以上)
- ・心機能が保持されていること
(心臓超音波検査にてEF60%以上など、1時間あたり500mLの補液に耐えうると期待されている場合)
- ・全身状態が良好であること(PS0-1)