

レジメン登録名

High dose FP療法

<投与薬物>


		投与量
① 5-FU	800 mg/m ² /day	_____mg
② CDDP	80 mg/m ² /day	_____mg
③ イメンド	day1→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day2・day3→イメンド80mg1日1回午前中	

5-FU 600mg に減量の場合 _____mg
 CDDP 60mgに減量の場合 _____mg

<投与法>

Day 1	[1] 生食100mL+グラニセトロン3mg 1筒+デカドロン1.65mg 6A		30min(側管)
	[2] ハルトマン 1000mL		240min
	[3] フロセミド20mg 1A		iv
	[4] マンニトールS 200mL		15min
	[5] 生食 400ml + シスプラチン	0 mg	120min
	[6] ハルトマン 500mL		60min
Day 1-5	[7] 生食 500mL + 5-FU	0 mg	20mL/h (1本24時間かけて)

<クール> 1週投与、3週休薬 4週1クール



<特記事項>

- * 他のフツ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間をあける。
- * CDDP投与前日にも補液1500～2000mL
- * 必要に応じてDay2～5の5-FU前に生食100mL+デカドロン1.65mg 4A
- * ハルトマンとCDDPは別ルートもしくはCDDP施行中はハルトマンを止めて下さい。