

レジメン登録名

S-1+低用量CDDP療法

<投与薬物>

		投与量
① S-1	80 mg/m ² /day	_____ mg
② CDDP	25 mg/m ² /day	_____ mg
③ CDDP	20 mg/m ² /day	_____ mg
④ CDDP	15 mg/m ² /day	_____ mg
⑤ イメンド	day1、day8、day15→イメンド125mg1日1回CDDP投与1時間～1時間30分前 day2・day3、day9・day10、day16・day17→イメンド80mg1日1回午前中	


CDDPの推奨投与量は②。DLT発現時は③、④へ。

<投与法>

day1-21 [1] S-1	0 mg/day	2×朝夕食後
day1,8,15	[2] リナセートD 500mL	90min(メイン)
	[3] 生食100mL+デカドロン1.65mg 6A+グラニセトロン3mg 1筒	30min(側管)
	[4] 生食500mL+シスプラチン 0 mg	120min(メイン)
	[5] フロセミド20mg 0.5A	シスプラチン終了後iv
	[6] ソリター-T3号500mL	90min(メイン)
	(必要に応じてアセトキープ3G500mL等翌日投与)	

<クール>

3週投与、2週休薬 5週間1クール



<特記事項>

注意)他のフッ化ピリミジン系薬剤を使用する場合、少なくとも7日間はあける。